

Welchen Nutzen hat Ihre Zusatzempfehlung?

✓ Hohe Kundenbindung durch umfassende Beratung

✓ Zusätzlicher Rohertrag für Ihre Apotheke: 6,35 € / Pkg.*

* zzgl. individuellem Großhandelsrabatt

Empfehlen Sie daher bei jedem Verkauf eines Rosazea-Kosmetikums zusätzlich **ICHTHRALETTEN®** – die rezeptfreie Lösung bei Rosazea

Praxisbeispiel Zusatzempfehlung

Eine Kundin/Ein Kunde kommt in Ihre Apotheke, um sich eine Rosazea-Tagespflege zu kaufen. Sie/Er leidet sichtbar unter geröteter Haut mit Papeln und Pusteln. Sie/Er berichtet auf Nachfrage von ihrer/seiner Diagnose Rosazea.

„Erhalten Sie derzeit eine Therapie?“

„ja, oral“**

→ Therapie-Alternative:
ICHTHRALETTEN®
Rücksprache mit Arzt

„ja, topisch“

→ Empfehlung von
ICHTHRALETTEN®
zusätzlich zur topischen Therapie

„nein“

→ Empfehlung von
ICHTHRALETTEN®

„Ich empfehle Ihnen – **ICHTHRALETTEN®**...

- ... als Unterstützung zur Pflege/topischen Therapie
- ... Dragees, 3 x täglich einzunehmen
- ... mit einem entzündungshemmenden Wirkstoff natürlichen Ursprungs
- ... effektive Wirkung gegen Pickel und Rötungen
- ... erste Erfolge nach 3 Wochen!“

Dosierung/Anwendung:
1. - 2. Woche: 3 x täglich 2 Tabletten
Ab 3. Woche: 3 x täglich 1 Tablette
Einnahme vor den Mahlzeiten mit etwas Wasser

****Wechselwirkungen:**
Die gleichzeitige Einnahme (innerhalb von 3 Stunden) von Tetracyklinen inaktiviert beide Stoffe.



Schnelle Hilfe gegen Rötung und Pickel.

ICHTHRALETTEN®

Die rezeptfreie orale Therapie bei Rosazea

Sie wollen Ihre Rosazea-Kunden umfassend beraten und unterstützen?

Und gleichzeitig Ihre Roherträge steigern?

Empfehlen Sie **ICHTHRALETTEN®** bei jedem Verkauf von Rosazea-Pflegeprodukten!

▶ ▶ ▶ Ihr Beratungsleitfaden

60 Stück PZN 04303298



ICHTHYOL für uns.



Der Leidensdruck bei Rosazea wird oftmals unterschätzt!



Sichtbare Belastung

- Persistierendes Erythem (Hautrötung)
- Teleangiektasien (erweiterte Äderchen)
- Papeln und Pusteln
- Flush, Trockenheit, Schuppung
- Chronisch, oftmals in Schüben

Emotionale Belastung

- Brennen, Stechen, Juckreiz
- Schamgefühl, Unsicherheit,
- Vorurteile (z. B. Alkoholmissbrauch)
- Meiden von Triggerfaktoren wie z. B. Sonne, Hitze, Kälte, Gewürze
- Beeinträchtigung im Arbeitsleben

- **Rosazea** ist eine entzündliche Dermatose
- Die Therapie erfolgt mit antientzündlichen Wirkstoffen
- Antibiotika werden aufgrund ihrer antiinflammatorischen Wirkung eingesetzt
- Rosazea ist nicht heilbar, aber gut behandelbar
- Die Therapie erfolgt dauerhaft und symptomatisch

Welche zugelassenen Therapieformen gibt es?

Systemische Arzneimittel

Topische Arzneimittel

OTC

Natriumbituminosulfonat
200 mg
ICHTHRALETEN®
(Tabletten)

Rx

Doxycyclin 40 mg

Off-label:
weitere Antibiotika,
Isotretinoin (teratogen!)

Rx

Metronidazol
Azelainsäure
Brimonidin
Ivermectin




60 Stück – AVP 25,18 €
PZN 04303298

Warum ICHTHRALETEN® bei Rosazea?

- ✓ Effektiv gegen Papeln, Pusteln und Erythem
- ✓ Antiinflammatorische Wirkung
- ✓ Wirkstoff natürlichen Ursprungs
- ✓ Sehr gut verträglich – OTC

Ergebnisse einer plazebokontrollierten Doppelblindstudie bei Patienten mit Rosazea papulopustosa¹:



¹ Koch, R., G. Mays: Orale Behandlung der Rosacea mit Natriumbituminosulfonat, OmniMed Verlagsgesellschaft mbH, 1996, S. 519-525

ICHTHRALETEN® Wirkstoff: Natriumbituminosulfonat (ICHTHYOL®-Natrium), Trockensubstanz. Zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 magensaftresistente Tablette (Dragee) enthält: Wirkstoff: Natriumbituminosulfonat (ICHTHYOL®-Natrium), Trockensubstanz 0,2 g. **Sonstige Bestandteile:** Weißer Ton, Lactose-Monohydrat, Copovidon, Glycerol, Stearinsäure, hochdisperses Siliciumdioxid, Sucrose (Saccharose), arabisches Gummi, Talkum, Eisenoxide und -hydroxide (E 172), Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Macrogol 6000, Montanglykolwachs. **Anwendungsgebiete:** Rosazea, auch mit Seborrhoe. **Gegenanzeigen:** Nachgewiesene Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium- und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. **Warnhinweise:** Enthält Lactose und Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten. **Nebenwirkungen:** Sehr selten Unverträglichkeitsreaktionen, wie z. B. leichte Beschwerden im Magen-Darm-Trakt. In Einzelfällen Auftreten von Hautrötungen, Hauttrockenheit und allergische Hautreaktionen. Apothekenpflichtig. **Darreichungsform, Packungsgrößen:** Magensaftresistente Tabletten (Dragees), Durchdrückpackung 60 Stck. Stand 2/2019 • ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG Sportallee 85 • 22335 Hamburg

ICHTHYOL für uns.

