

PERENTEROL®

Junior 250 mg Toz

2 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler için
Saccharomyces-cerevisiae-Kuru maya

Tüm kullanma talimatını özenle okuyunuz, çünkü içerisinde sizin için önemli bilgiler var.

Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Perenterol Junior 250 mg Toz'un tavsiye edildiği şekilde kullanılması gerekir.

- Kullanma talimatını saklayınız. Belki daha sonra tekrar okumak isteyebilirsiniz.
- Daha ayrıntılı bilgiye veya tavsiyeye ihtiyacınız olursa eczacınıza sorunuz.
- Eğer şikâyetleriniz artarsa veya 2 gün sonra bir iyileşme görülmezse, mutlaka bir doktora başvurunuz.
- Eğer belirtilen yan etkilerden bir tanesi sizi çok olumsuz etkiliyorsa veya siz kullanım bilgilerinde belirtilmemiş olan bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Kullanma talimatının içeriği:

1. Perenterol Junior 250 mg Toz nedir ve ne için kullanılır?
2. Perenterol Junior 250 mg Toz kullanmadan önce neye dikkat etmelisiniz?
3. Perenterol Junior 250 mg Toz nasıl alınmalıdır?
4. Hangi yan etkiler görülebilir?
5. Perenterol Junior 250 mg Toz nasıl saklanmalıdır?
6. Diğer bilgiler

1. Perenterol Junior 250 mg Toz NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Perenterol Junior 250 mg Toz, kuru maya içeren bir ilaçtır. İshal ve akne için kullanılır.

Perenterol Junior 250 mg Toz aşağıdaki hallerde kullanılır:

- Akut ishal rahatsızlıklarında şikâyetlerin tedavisi.
- Seyahat esnasındaki ishal şikâyetlerinin tedavisi ve önlenmesi.
- Sonda ile beslenme sırasındaki ishal şikâyetlerinin tedavisi ve önlenmesi.
- Daha uzun süren akneler için eşlik edici tedavi.

2. Perenterol Junior 250 mg Toz KULLANMADAN ÖNCE NEYE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Perenterol Junior 250 mg Toz şu hallerde alınamaz,

- eğer Perenterol Junior 250 mg Toz içerisindeki mayaya veya diğer bileşenlerine karşı aşırı (alerjik) duyarlılığınız varsa.
- eğer hayati tehlikesi olan bir hastalığınız varsa (örn. komplike yoğun ilaç kullanılan hastalık seyirleri) veya zayıf bir savunma sisteminiz varsa (örn. HIV enfeksiyonları, organ nakilleri, lösemi, kötü huylu tümörler, ısın tedavisi, kemoterapi, uzun süreli yüksek dozda kortizon tedavisi) ve/veya merkezi damar kateteriniz varsa.

Bu hallerde Saccharomycesboulardii'nin tüm vücuda yerleşmesi riski (genel yerleşim) şu ana kadar tahmin edilememiştir.

Süt bebeklerinde ve 2 yaş altındaki küçük çocuklarda her halükarda kendi kendine tedavi etme girişiminden kaçınılmalıdır, çünkü süt bebeklerinde ve 2 yaş altındaki küçük çocuklardaki ishallerin doktor ile görüşülmesi gerekmektedir.

Özellikle aşağıdaki hallerde Perenterol Junior 250 mg Toz alınırken dikkatli davranmak gerekir:

- Eğer ağır temel hastalıklarınız varsa, özellikle mide bağırsak bölümünde.

Saccharomycesboulardii, yaşayan bir mikroorganizmadır, elverişsiz şartlarda, savunması zayıf hastalarda meydana geldiği gibi, mide-bağırsak bölümünden kan dolaşımına geçebilir veya merkezi damar kateterinin dışındaki kirletici sebebiyle genel mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Hastanede yatan hastalarda bu tür özel olaylara rastlanmıştır. Bu olaylarda hastaların merkezi damar kateteleri, hayati riski olan hastalıkları ya da (çoğunlukla mide-bağırsak bölümünde) temel hastalıkları veya çok zayıf bir immün sistemleri vardı.

2 günden fazla süren veya kanlı ishallerde ya da ateş yükselmelerinde, bir doktora başvurunuz.

İshallerde, özellikle çocukların kaybedilen sıvı ve tuzların (elektrolitler) ikame edilmesine en önemli tedavi tedbiri olarak dikkat etmelisiniz.

Aknenin kötüleşmesi veya iyileşmemesi durumunda bir doktora başvurmalsınız.

Eğer Perenterol Junior 250 mg Toz ile tedavi sırasında veya hemen sonra mikrobiyolojik gaita tetkikleri gerçekleştirilirse, o zaman siz veya doktorunuz, bu ilacın kullanıldığını inceleyen laboratuvara bildirmelisiniz, aksi takdirde hatalı-pozitif bulgular ortaya çıkabilir.

Perenterol Junior 250 mg Toz'un başka ilaçlarla birlikte alımı

Aynı anda, mide-bağırsak bölgesinde etki eden, mantar ilaçları (Antimiyotikler) kullanmayınız. Bu, Perenterol Junior 250 mg Toz ile uygulanan tedavi sonucunu olumsuz etkileyebilir.

Bu bilgilerin, kısa süre önce uygulanmış ilaçlar için de geçerli olabileceğini dikkate alınız.

Eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız veya kısa süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz, reçeteyle satılan bir ilaç olmasa bile.

Perenterol Junior 250 mg Toz'un gıda ve içeceklerle birlikte alımı

Poşetleri alkol ile beraber alamazsınız.

Hamilelik ve emzirme dönemi

Gıda maddesi olarak mayanın yaygın kullanımından dolayı şu ana kadar hamilelik ve emzirme sırasında kullanımı konusunda risklere dair bilgi yer almamaktadır. Saccharomyces boulardii için deneysel tetkik sonuçları mevcut değildir. O nedenle bu ilaç hamilelik ve emzire döneminde kullanılmamalıdır.

Araba ve makine kullanımı

Önleyici tedbir alınmasına gerek yoktur.

Perenterol Junior 250 mg Toz içerisindeki diğer belirli bileşenlerle ilgili önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içerir. Şayet belirli şekere karşı hazımsızlık sorunuz varsa, Perenterol Junior 250 mg Toz'u sadece doktorunuzla görüşükten sonra kullanınız.

3. Perenterol Junior 250 mg Toz NASIL ALINMALIDIR??

Perenterol Junior 250 mg Toz'u her zaman bu ambalajın içerisindeki kullanma talimatına göre kullanınız. Tam olarak emin olmadığınız zaman, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Perforasyon çizgisinden ikili poşeti birbirinden ayırınız. Aşağıdaki dozaj talimatları her bir poşet için ayrı ayrı geçerlidir.

Eğer doktor tarafından farklı biçimde düzenlenmediyse, bilinen dozu 2 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler için şöyledir:

- Akut ishal tedavisi için günde 1-2 kez 1 poşet (günlük eşdeğeri 250 ila 500 mg Saccharomycesboulardii kuru mayası).
- Seyahat esnasındaki ishalleri önlemek için, seyahat başlamadan 5 gün önce başlayarak, günde 1-2 kez 1 poşet (günlük eşdeğeri 250 ila 500 mg Saccharomycesboulardii kuru mayası).
- Sonda ile beslenmeye bağlı ishal için her gün 1,5 litre besleyici solüsyon içerisinde 3 poşet içeriği (günlük eşdeğeri 750 mg Saccharomycesboulardii kuru mayası).
- Akne için günde 3 kez 1 poşet (günlük eşdeğeri 750 mg Saccharomycesboulardii kuru mayası).

Poşetin içeriğini bol miktarda su veya başka içecekler içerisinde veya yiyeceklere karıştırınız, bu yiyecek ve içecekler ne çok sıcak (50°C üzerinde) ne de buz gibi soğuk olmalıdır.

Kullanım süresi

Maya preparatlarının alımında prensip olarak kullanım süresi kısıtlamaları yoktur. Ancak lütfen Kısım 2.'de „Perenterol Junior 250 mg Toz alımında özellikle dikkat gereklidir...” ve Kısım 4.'te „HANGİ YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR?” içerisinde yer alan bilgilere uyunuz.

- İshallerde, şikayetler azaldıktan sonra da tedavi birkaç gün devam ettirilmelidir.
- Kronik aknede eşlik edici tedavi olarak birkaç hafta alınması önerilir.

Eğer Perenterol Junior 250 mg Toz'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Eğer almanız gerekenden daha yüksek dozda Perenterol Junior 250 mg Toz aldıysanız

Eğer bir kere yanlışlıkla öngörülene göre bir veya iki poşet fazla aldıysanız, bunun genel olarak olumsuz sonuçları olmaz. Ancak bu ilacı aşırı dozda aldıysanız bu, yan etkilerin daha şiddetli görülmesine yol açabilir (bakınız kısım 4. "HANGİ YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR?"). Bu durumda doktorunuzla görüşmelisiniz.

Eğer Perenterol Junior 250 mg Toz'u almayı unuttuysanız

Asla çift doz almayınız, eğer önceki dozu almayı unuttuysanız.



4. HANGI YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi Perenterol Junior 250 mg Toz de yan etkilere neden olabilir, ama bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmak zorunda da değildir.

Alımı, karın şişkinliğine yol açabilir.

Ayrıca aşırı hassasiyet reaksiyonları, örn. kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), ya lokal sınırlar içerisinde veya tüm vücutta (lokal veya genel eksanterm gibi) deride döküntü meydana gelebilir ve de cilt ve mukoza ödemleri görülebilir, özellikle de yüzde (Quincke Ödemi). Bunun dışında nefes darlığı ve alerjik şok da gözlenebilir.

Saccharomycesboulardii'nin merkezi damar kateterli hastalarda, hayati tehlikesi bulunan hastalarda, ağır temel hastalığı olan veya immün sistemi zayıf olan hastalarda kan dolaşımına yerleşebileceğine dair raporlar mevcuttur.

Bu olası yan etkilerin sıklıkları konusunda bilgi bulunmamaktadır.

Eğer özellikle de bu kullanma talimatının içerisinde belirtilmeyen yan etkiler gözlemlerseniz, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Yan etkilerde hangi karşı tedbirler alınmalıdır?

Eğer bahsi geçen yan etkilerden, özellikle de yüz bölgesindeki mukoza ödemi (Quincke ödemi), nefes darlığı veya alerjik şok gözlemliyorsanız, bu ilacı bırakınız ve (derhal) bir doktora bilgi veriniz ki, kendisi yan etkinin şiddeti konusunda ve gerekli karşı tedbirler konusunda karar verebilsin.

5. Perenterol Junior 250 mg Toz nasıl SAKLANMALIDIR?

İlaçları çocukların erişemeyecekleri yerde saklayınız.

İlacı poşetin ve kartonun üzerinde yazan "son kullanma tarihi"nden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ayın son günüdür.

6. DİĞER BİLGİLER

Perenterol Junior 250 mg Toz ne içerir

Etken madde Saccharomyces-cerevisiae-kuru maya'dır.

1 poşet HANSEN CBS 5926 Saccharomycescerevisiae'den 250 mg kuru maya içermektedir (tıp dilinde Saccharomyces Boulardii olarak da tanımlanmaktadır) eşdeğeri en azında $1,8 \times 10^{10}$ canlı hücre/g Liyofilisat.

Diğer bileşenler Laktoz Monohidrat, Fruktöz (Ph.Eur.), çok dağılan Silisyum Dioksit, Tutti-Frutti Aroması, toz, yapay.

Perenterol Junior 250 mg Toz görünümü ve paket içeriği

Perenterol Junior 250 mg Toz, perforasyon çizgili ikili poşet içerisinde kremimsi, beyaz bir tozdur.

Perenterol Junior 250 mg Toz 10, 20, 50, 100 sert poşet içeren paketler halinde temin edilebilir.

Muhtemelen tüm ambalaj büyüklükleri dolaşıma sokulmamaktadır.

Farmasötik girişimci ve üretici

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
D-58638 Iserlohn

Tel.: 02371 937-0
Faks: 02371 937-106

E-posta: info@medice.de

Bu kullanma talimatı en son Kasım 2012 tarihinde revize edilmiştir.

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan dahili tercümesi.

