

## Pflichtangaben

**Calmvalera Globuli** Zusammensetzung: In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet: Avena sativa Dil. D2 20 mg, Nux vomica Dil. D5 10 mg, Zincum valerianicum Dil. D3 3 mg. Sonstiger Bestandteil: Sucrose. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehören: Neurasthenie, nervöse Reizbarkeit. Gegenanzeigen: Säuglinge unter 6 Monaten. Zul.-Nr. 6152448.00.00. Packungsgröße: 7,5 g Streukügelchen.

**Calmvalera Tabletten** Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Cimicifuga D3 20 mg, Cocculus D4 20 mg, Cypridium pubescens D4 10 mg, Ignatia D6 40 mg, Liliun tigrinum D6 20 mg, Passiflora incarnata D3 40 mg, Platinum metallicum D8 20 mg, Valeriana D2 20 mg, Zincum valerianicum D3 20 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervös bedingte Unruhezustände und Schlafstörungen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Frauenschuhgewächse und Platinverbindungen. Nebenwirkungen: Es können Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Hautreaktionen, und Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Übelkeit, auftreten. Zul.-Nr. 77957.00.00. Packungsgrößen: 50, 100, 200 Tabletten.

**Contrainfect Hevert Erkältungstabletten** Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Apis D4 20 mg, Atropinum sulfuricum D4 20 mg, Cinnabaris D6 20 mg, Echinacea D2 20 mg, Hepar sulfuris D6 20 mg, Kalium bichromicum D6 20 mg, Kalium chloratum D4 20 mg, Lachesis D10 20 mg, Silicea D3 20 mg, Spongia D6 20 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der oberen Atemwege. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Chrom, Echinacea oder andere Korbblütler. Nicht anwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie, Leukosen, Kollagenosen, Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen. Nicht anwenden bei Kindern unter 10 Jahren sowie in Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Es können Speichelfluss und Hautreaktionen auftreten. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Echinacea wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall, anaphylaktischer Schock, Stevens Johnson Syndrom beobachtet. Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen können allergische Reaktionen ausgelöst werden. Bei Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) können Blutbildveränderungen (Leukopenie) auftreten. Zul.-Nr. 6888221.00.00. Packungsgrößen: 40, 100 Tabletten.

**Digesto Hevert Verdauungstropfen** Zusammensetzung: 10 g Tropfen enthalten: Eichhornia D1 2,94 g, Okoubaka D2 1,95 g, Quassia amara Urtinktur 0,49 g, Taraxacum D1 2,57 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 43% (m/m). Enthält 60 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Verdauungsschwäche. Gegenanzeigen: Kinder unter 6 Jahren. Nebenwirkungen: Selten Durchfälle. Zul.-Nr. 6884134.00.00. Packungsgrößen: 30 ml, 100 ml Tropfen.

**Kohle Hevert** Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Medizinische Kohle 250 mg. Sonstige Bestandteile: Eisenoxid schwarz, niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearat, Maltodextrin, Povidon K25, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Bei Durchfall sowie bei Vergiftungen durch Nahrungsmittel, Schwermetalle und Arzneimittel. Nicht anwenden bei Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel. Gegenanzeigen: Fieberhafte Diarrhoe. Zul.-Nr. 3199.99.99. Packungsgrößen: 20, 50, 100, 300 Tabletten.

**Sinusitis Hevert SL** Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Apis D4 10 mg, Baptisia D4 5 mg, Cinnabaris D3 5 mg, Echinacea D2 30 mg, Hepar sulfuris D3 10 mg, Kalium bichromicum D8 30 mg, Lachesis D8 10 mg, Luffa D4 60 mg, Mercurius bijodatus D9 70 mg, Silicea D2 5 mg, Spongia D6 10 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen des Hals-Nasen-Rachenraumes und der Nasennebenhöhlen (Sinusitis). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen (Echinacea). Bei Schilddrüsenerkrankungen sowie in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Nebenwirkungen: Verstärkter Speichelfluss, Haut- und Überempfindlichkeitsreaktionen können auftreten. Zul.-Nr. 6884252.00.00. Packungsgrößen: 40, 100, 300 Tabletten.

**Vertigo Hevert SL** Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Cocculus D4 175 mg, Conium D3 25 mg, Tabacum D4 50 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Schwindel. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Zul.-Nr. 6884192.00.00. Packungsgrößen: 40, 100 Tabletten.